

Obdukcija je potrdila, da so bili vsi trije Baričevičevi bulmastifi pokončani s strelnim orožjem. Psica Joy je podlegla strelni rani na temenici, na sredini med obema uhljema. Pri psu Atlasu so ugotovili dve strelni rani. Atlasa je en naboj zadel v teme, drugi pa v trebuh. Pri obdukciji je bil najden še en naboj v mišičini desne pleče, ki je bil obdan z vezivno ovojnico, kar po mnenju veterinarskih patologov kaže, da je bil v telesu že dlje časa (najbrž od prvega napada Baričevičevih bulmastivov na Stanislava Megliča marca 2006). Tretji pes Atos je bil pokončan s tremi naboji – eden ga je zadel v levi rebrni lok, drugi v levo trebušno steno in tretji v ledja.

#### NACIONALNI VETERINARSKI INŠTITUT

Enota za diagnostiko kužnih in drugih bolezni živali

Laboratorij za patologijo in TSE

Telefon: (01) 47-79-155 Fax: (01) 28-34-091

VURS OU LJUBLJANA Izpostava Kočevje

št. PP/121/10

TZO 2

Datum: 10. 2. 2010

H. Bunderla, dr. vet. med.

1330 KOČEVJE

#### POROČILO O OPRAVLJENI PREISKAVI

Žival:

PES "Atos", bulmastif, ID 70523000029598,

m. sp. 6 let

Baričevič Sašo, Oražnova 11, Ljubljana

napotnica št. 0617-200/2006 / 3.2.2010

3.2.2010/3.2.2010

Št. protokola / datum naročila:

Institutu za patologijo, sodno in upravno veterinarstvo

Datum prejema / dat. raztelesbe:

mag. Maja Gombač, dr.vet.med.

Raztelesba opravljena na:

mag. Maja Gombač, dr. vet. med.

Raztelesbo opravil:

Patohistološko preiskavo opravil:

je okrogle raztrganina, premra 1 cm, z rdečimi, razcefranimi robovi, na sredini velike krivine je v steni želodec vretenasta raztrganina seroze in mišične plasti stene, velikosti 4 x 2 cm, z rdečimi, razcefranimi robovi (*Laceratio totalis parietis et laceratio serosae et tunicae muscularis partis fundicis ventriculi – vulnus scelopetarium*).

Črevesje: Tanko črevo je blago napolnjeno z rumenkasto sluzjo, sluznica je siva. Debelo črevo je blago napolnjeno z rjavo zelenim, gosto kašastim fecesom, sluznica je sivo-bela, v sluznici so, 2 cm pred vhodom v medenično votilino, številne krvavitve, premra od 1 mm do 1 cm (*Haemorrhagiae circumscriptae numerosae mucosae partis caudalis coli*). V začetnem delu sluznice rektuma, tik ob anorektalnem stiku, je 5 vretenastih raztrganin, velikosti 1 x 0,5 cm, s sivimi, razcefranimi robovi ter 1 cm široka ploščata krvavitve. Analna odprična je delno odprtia - premer analne odprične je 1,5 cm (*Orificium ani apertum. Lacerations V et haemorrhagiae circumscriptae mucosae recti in regio lineae anorectalis*). Mezenterij je prosojen (b. p.).

Črevesne bezgavke: So normalne oblike in velikosti, sive (b. p.).

- Ijetra: So normalne oblike in velikosti, svetlo rjave, blago anemična, na zgornjem delu levega lateralnega režnja je veliko raztrganin z rdečimi, razcefranimi robovi (*Lacerationes lobii lateralis sinistri et anaemia gradus hepatis – vulnus scelopetarium*). V žolčniku je 2 ml zelenega žolčka, sluznica je b. p.
- Ledvici: Sta normalne oblike in velikosti, svetlo rjavi, močno anemični (*Anaemia gradus gravis renum*).
- Sečnik: V sečniku je 10 ml bistrega, rumenega urina, sluznica je bela (b. p.).